



MANUAL PROFESIONAL

Recepción, crianza, salud y bioseguridad

Pollitos Corridos, Mejorados y Gigantes
Colombianos
Incubadora Luz de León

Guía digital interactiva

Santo Domingo, Ecuador
WhatsApp: **096 052 9431**
Atención: lunes a viernes, 09:00 a 17:00

Edición 1.0 - Julio de 2026

DOCUMENTO OFICIAL DE ORIENTACIÓN

Un buen inicio cambia todo

Este manual reúne la experiencia de Incubadora y Granja Luz de León con recomendaciones técnicas de manejo avícola. Está diseñado para acompañar al cliente desde la preparación del espacio hasta la madurez de las aves.

Importante: el manual no sustituye el diagnóstico de un médico veterinario. Los signos respiratorios, diarreas, mortalidad inusual o alteraciones neurológicas pueden tener múltiples causas y requieren evaluación profesional.



La información sobre garantías, entregas y seguimiento corresponde a la política comercial de la granja vigente a julio de 2026.

**WhatsApp**

Toque o escanee

**Página web**

Manual y novedades

**Facebook**

Videos y entregas

**TikTok**

Consejos breves

TOCAR AQUÍ PARA ESCRIBIR POR WHATSAPP**VISITAR LA PÁGINA WEB**

Contenido interactivo

Toque un capítulo para ir directamente a la sección.

1. Conozca nuestras aves	4
2. Preparación antes de la llegada	5
3. Recepción y primeras horas	6
4. Alojamiento, cama y temperatura	7
5. Agua, hidratación y limpieza	9
6. Alimentación por etapa	10
7. Vacunación y bioseguridad	11
8. Vitaminas, electrolitos y productos de apoyo	13
9. Diarreas, signos respiratorios y alertas	14
10. Estrés, picaje y bienestar	16
11. Crecimiento, huesos y reproducción	17
12. Garantías y reportes mensuales	18
13. Entregas y envíos	19
14. Ciudades a las que hemos enviado	20
15. Videoteca educativa	24
16. Formatos de seguimiento	25
17. Fuentes técnicas	27

Consejo: guarde este PDF en su teléfono. Todos los botones rojos, amarillos y verdes son enlaces activos.

1. Conozca nuestras aves



Criollo Mejorado

Ave rústica seleccionada por desarrollo corporal, adaptación y aptitud de doble propósito. El crecimiento es gradual y depende de alimentación completa, sanidad, sexo, clima y espacio.

Referencia interna: la madurez sexual suele iniciar alrededor de los 6 meses y el desarrollo corporal continúa aproximadamente hasta los 10 meses.

Gigante Colombiano

Línea de gran talla, hueso fuerte y crecimiento prolongado. Necesita piso seguro, buena tracción, alimentación equilibrada y evitar saltos desde alturas.

Referencia interna: el desarrollo puede continuar aproximadamente hasta los 12 meses.

Variación natural: no todos los pollitos crecen al mismo ritmo. Los machos y las hembras difieren en tamaño; el estado sanitario, la calidad del alimento y el manejo influyen de forma decisiva.

Sexaje: en edades tempranas no se garantiza macho, hembra o pareja, salvo que la venta se haya realizado expresamente como aves sexadas.

2. Preparación antes de la llegada

El espacio debe estar listo antes de recibirlos

- ✓ Área pequeña, limpia, seca, protegida de lluvia y corrientes de aire.
- ✓ Cama absorbente preparada: viruta limpia, cascarilla/tamo de arroz o material equivalente.
- ✓ Fuente de calor probada con anticipación cuando el clima o la edad lo requieran.
- ✓ Bebederos y comederos limpios, suficientes y accesibles.
- ✓ Alimento iniciador o de crecimiento apropiado para la edad.
- ✓ Termómetro a la altura de los pollitos.
- ✓ Espacio separado de aves adultas y animales recién comprados.
- ✓ Teléfono listo para grabar el video de recepción.



Kit básico recomendado

Elemento	Para qué sirve	Observación
Viruta o tamo seco	Aislamiento térmico y absorción	Retirar de inmediato las zonas mojadas.
Termómetro	Control del ambiente	Medir a la altura del ave, no cerca del techo.
Electrolitos/vitaminas para aves	Apoyo tras transporte	Usar producto registrado y seguir la etiqueta.
Desinfectante de uso pecuario	Limpieza entre lotes	No aplicar con aves presentes salvo indicación de etiqueta.
Registro de mortalidad y consumo	Detectar problemas temprano	Anotar fecha, signos, alimento y agua.

3. Recepción y primeras horas

1 Grabe antes y durante la apertura

Registre la caja cerrada, fecha y hora, apertura continua, conteo y estado general de cada pollito. Este video es indispensable para la garantía de recepción.

2 Ubique de inmediato en un sitio seco y protegido

No deje la caja al sol, bajo lluvia, en el piso frío ni dentro de un vehículo cerrado.

3 Ofrezca agua primero

Agua potable, fresca y a temperatura ambiente. Puede utilizar electrolitos para aves según la etiqueta. En casos de viaje prolongado, una solución comercial de rehidratación es preferible a mezclas caseras concentradas.

4 Ofrezca alimento completo

Coloque pequeñas cantidades en bandejas limpias para que todos identifiquen el alimento. Luego utilice comederos adecuados.

5 Observe durante 2 a 4 horas

Compruebe que beben, comen, se desplazan y descansan sin amontonarse.

Puede ser normal tras el viaje:

cansancio leve, sed, menor actividad durante un corto periodo y plumas desordenadas, siempre que mejoren al hidratarse y calentarse.

No espere: dificultad para respirar,

sangrado, incapacidad para mantenerse de pie, diarrea intensa, signos neurológicos o muerte deben reportarse inmediatamente.

TOCAR AQUÍ: VIDEO PARA RECIBIR CORRECTAMENTE LOS POLLITOS

4. Alojamiento, cama y temperatura

NO RECOMENDAMOS JAULAS ELEVADAS DE MALLA PARA POLLITOS

Aunque facilitan la limpieza, pueden dejar a las aves expuestas a corrientes de aire y sin una cama aislante. En el sistema recomendado por Luz de León, los pollitos se crían sobre piso firme con una capa seca y absorbente.

Cama recomendada

- ✓ Viruta de madera limpia y sin polvo excesivo.
- ✓ Tamo o cascarilla de arroz seca.
- ✓ Material absorbente, no tóxico y libre de moho.
- ✓ Espesor orientativo de 5 a 10 cm, ajustado al clima y humedad.

No usar

- ✗ Piso desnudo de cemento, baldosa o metal.
- ✗ Plástico como cama.
- ✗ Aserrín demasiado fino y polvoriento.
- ✗ Material húmedo, con hongos o mal olor.
- ✗ Periódico liso como superficie permanente: causa resbalones.

La cama correcta debe permanecer

SECA

No debe formar barro ni pegarse a las patas.

SUELTA

Remueva las zonas compactadas.

SIN OLOR FUERTE

El olor a amoníaco indica humedad y ventilación deficiente.

Regla práctica: coloque los bebederos sobre una base estable ligeramente elevada para reducir derrames, pero mantenga el borde a una altura cómoda para el ave.

Temperatura y comportamiento

La edad exacta y el clima determinan la necesidad de calor. Los pollitos jóvenes no regulan bien su temperatura; el piso y la cama deben estar templados antes de su llegada.

Edad aproximada	Temperatura orientativa a nivel del pollito	Manejo
0-7 días	32-35 °C	Calor continuo con zona de escape.
8-14 días	29-32 °C	Reducir gradualmente, según comportamiento.
15-21 días	27-29 °C	Vigilar especialmente noches frías.
22-28 días	24-27 °C	Puede requerir calor nocturno en Sierra o lluvias.
Más de 4 semanas	Confort según plumaje y clima	Retirar calor solo si no se agrupan ni tiemblan.

Los rangos son orientativos. La conducta de las aves y la medición a su altura son más útiles que la temperatura general de la habitación.

Demasiado frío

Se amontonan bajo la fuente, chillan fuerte, comen menos y están apáticos.

Confort

Se distribuyen de manera uniforme, comen, beben y descansan tranquilos.

Demasiado calor

Se alejan, jadean, abren las alas y consumen más agua.

Sierra y zonas frías: durante la primera semana posterior a la recepción puede requerirse calor día y noche; luego, calor nocturno. Ajuste según edad, temperatura y conducta.

Costa y climas cálidos: puede no requerirse calor adicional, pero sí protección contra lluvia, viento nocturno y cambios bruscos.

Seguridad contra incendios: las lámparas deben quedar firmemente sujetas, lejos de viruta, cartón, plástico, cables sueltos y agua. Una bombilla LED ilumina, pero no funciona como fuente eficaz de calor.

5. Agua, hidratación y limpieza

El agua es el nutriente más importante. Debe estar disponible todo el tiempo, limpia, fresca y protegida de heces, polvo, alimento y animales externos.

NUNCA MEZCLE CLORO CON VINAGRE O ÁCIDOS

La mezcla puede liberar gases tóxicos. Además, la concentración del cloro doméstico varía; por eso no es profesional indicar “gotas por litro” sin conocer el producto ni medir el cloro residual.

Opción preferida

Utilice agua potable. Lave y cepille los bebederos diariamente, enjuague y rellene con agua fresca.

Si el agua requiere tratamiento

Use un sanitizante o acidificante autorizado para agua de aves, siga la etiqueta y mida pH/cloro residual. Consulte a un técnico cuando el agua provenga de pozo o tenga olor, color o sedimentos.

Práctica	Frecuencia	Objetivo
Vaciar, cepillar y enjuagar bebederos abiertos	Diaria	Evitar biofilm, heces y alimento fermentado.
Revisar fugas y derrames	Varias veces al día	Mantener la cama seca.
Limpiar tanque y tuberías	Según plan y fabricante	Controlar sedimentos y biofilm.
Analizar agua	Al menos anual o ante problemas	Conocer calidad microbiológica y química.

Medicamentos y vacunas en agua: no combine con cloro, desinfectantes, acidificantes o vitaminas salvo que la etiqueta indique compatibilidad. Prepare únicamente el volumen que las aves consumirán en el tiempo recomendado.

6. Alimentación por etapa

Etapa	Alimento principal	Recomendación
0-6 semanas	Iniciador para pollitos	Alimento completo, fresco y adecuado para la especie. No diluir con maíz o sobras.
6-18/20 semanas	Crecimiento o desarrollo	Seleccionar fórmula para aves en crecimiento o reproductores jóvenes.
Aves destinadas a carne	Crecimiento/ finalizador	La estrategia depende de la velocidad de crecimiento deseada y condición corporal.
Inicio de postura	Postura	Introducir cerca del primer huevo, no durante la crianza temprana.

No dar alimento de postura a pollitos o aves inmaduras. El exceso de calcio en aves en crecimiento puede causar daño renal, retraso y mortalidad. El calcio inyectable no es una práctica rutinaria: debe reservarse para casos diagnosticados por un veterinario.

Maíz, verduras y pastoreo

Después de la etapa inicial pueden ofrecerse en cantidades moderadas como complemento. No deben reemplazar el balanceado completo, especialmente durante el crecimiento.

Altura del comedero

Ajuste el borde aproximadamente a la altura del dorso/buche de las aves para reducir contaminación y desperdicio. Revise la altura cada semana.

Señales de un programa alimenticio deficiente

- Crecimiento desigual o pérdida de peso.
- Plumaje pobre, picaje o consumo de cama.
- Patas débiles, dedos torcidos o dificultad para caminar.
- Heces anormales persistentes.
- Exceso de gordura o desarrollo sexual demasiado temprano.

7. Vacunación y bioseguridad

Antes de aplicar cualquier vacuna, confirme por escrito qué vacunas recibió el pollito en incubadora. Repetir o combinar vacunas sin conocer el historial puede disminuir la eficacia o provocar reacciones innecesarias.

Ecuador: AGROCALIDAD establece la vacunación obligatoria contra Newcastle para predios con parvadas mayores a 100 aves, utilizando vacunas autorizadas y registradas. Los programas dependen de la región, tipo de producción y desafío sanitario.

Esquema orientativo para conversar con el veterinario

Enfermedad	Momento habitual	Observación
Newcastle / Bronquitis infecciosa	Primeras semanas y refuerzos	El programa exacto depende del historial y riesgo local.
Gumboro	Primeras semanas	La edad depende de anticuerpos maternos y vacuna previa.
Viruela aviar	Levante, según zona	Aplicación por punción alar; usar solo si corresponde al plan.
Coriza, Marek u otras	Según destino y epidemiología	No todas se aplican a todos los lotes.

No vacune aves enfermas, deshidratadas o bajo estrés severo. Las vacunas deben mantenerse en cadena de frío de 2 a 8 °C, protegidas de la luz, y aplicarse por la vía indicada en la etiqueta.

Buenas prácticas durante la vacunación

- ✓ Verificar caducidad, lote y registro del producto.
- ✓ Usar el diluyente correcto.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria.
- ✓ Evitar cloro y desinfectantes en el agua de vacuna.
- ✓ Registrar fecha, vacuna, lote, vía y responsable.
- ✓ Desechar frascos y materiales con seguridad.

Bioseguridad diaria

Evite el ingreso de enfermedades

- ✓ No mezcle de inmediato aves de distintos orígenes.
- ✓ Cuarentena mínima orientativa de 30 días para aves nuevas.
- ✓ Calzado y utensilios exclusivos para el gallinero.
- ✓ Control de roedores, moscas, aves silvestres y depredadores.
- ✓ No comparta jaulas, bebederos ni herramientas sin desinfectar.

Lleve registros

- ✓ Consumo de agua y alimento.
- ✓ Mortalidad y signos observados.
- ✓ Vacunas y medicamentos.
- ✓ Cambios de alimento.
- ✓ Temperatura, humedad y estado de la cama.

No se reciben visitas en la granja. Esta política protege la seguridad de las personas y reduce el riesgo de introducir agentes infecciosos mediante ropa, calzado, vehículos o equipos.

Cuando ingrese a su propio gallinero

1. LIMPIE

Retire materia orgánica antes de desinfectar.

2. DESINFECTE

Use productos de uso pecuario conforme a la etiqueta.

3. SEQUE

La humedad reduce el confort y favorece problemas.

8. Vitaminas, electrolitos y productos de apoyo

Los productos comerciales cambian por país y proveedor. Seleccione únicamente productos registrados para aves, revise la composición y siga la etiqueta. No combine varios productos con ingredientes repetidos.

Función	Opciones	Uso responsable
Rehidratación y antiestrés	Electrolitos con glucosa y vitaminas para aves; ejemplos comerciales como Electravite o equivalentes.	Útiles tras transporte, calor o consumo reducido. Preparar agua fresca y respetar la dosis de etiqueta.
Vitaminas y aminoácidos	Promotor L 47 o productos equivalentes con vitaminas/aminoácidos.	Apoyo nutricional temporal; no reemplaza alimento completo ni corrige una infección.
Probióticos	Productos para aves con Lactobacillus, Bacillus o levaduras.	Pueden apoyar estabilidad intestinal, especialmente después de estrés. Elegir producto veterinario y seguir etiqueta.
Acidificantes de agua	Mezclas comerciales de ácidos orgánicos para avicultura.	Usar con medidor de pH y según etiqueta. No mezclar con cloro.
Coccidiosis	Alimento medicado, vacuna o medicamentos como amprolio/toltrazuril, según plan.	No usar de forma indiscriminada. El diagnóstico, edad y producto previo importan.
Antibióticos	Solo fármacos registrados y prescritos.	Requieren diagnóstico, dosis exacta y tiempo de retiro. Nunca “cualquier antibiótico”.

Oxi Stress: la presentación comercial revisada incluye antibiótico además de vitaminas y oligoelementos. Por tanto, no debe manejarse como una vitamina de rutina; úselo únicamente bajo orientación veterinaria y respetando el tiempo de retiro.

Menos es más: agua limpia, temperatura correcta, cama seca y alimento completo previenen más problemas que una mezcla de múltiples vitaminas y medicamentos.

9. Diarreas, signos respiratorios y alertas

Las heces acuosas no siempre significan la misma enfermedad

Posible causa	Pistas	Acción inicial
Exceso de agua, calor o cambio de alimento	Heces húmedas sin sangre; aves activas	Revisar temperatura, agua y dieta.
Agua o alimento contaminado	Varios animales afectados; mal olor	Cambiar agua/alimento, limpiar y aislar afectados.
Coccidiosis	Decaimiento, pérdida de peso, moco o sangre	Atención veterinaria rápida y revisión de cama.
Enfermedad infecciosa	Diarrea con mortalidad, signos respiratorios o neurológicos	Aislar y reportar; no medicar a ciegas.

Heces cecales: una o varias veces al día las gallinas producen deposiciones oscuras, pastosas y de olor fuerte. Pueden ser normales si el ave está activa y el resto de heces es normal.

Prevención de problemas intestinales

- ✓ Agua potable y bebederos limpios.
- ✓ Cama seca y sin acumulación de heces.
- ✓ No sobrepoblar.
- ✓ Alimento fresco, protegido de humedad y roedores.
- ✓ No cambiar de alimento bruscamente.
- ✓ Separar aves enfermas y registrar signos.

TOCAR AQUÍ: VIDEO DE PREVENCIÓN DE DIARREAS

Signos respiratorios: “moquillo” no es un diagnóstico

Los clientes suelen llamar “moquillo” a secreción nasal, estornudos o ruido respiratorio. Esos signos pueden deberse a frío, polvo, amoníaco, bronquitis infecciosa, Newcastle, coriza, micoplasma, influenza aviar u otras causas.

Primeras medidas seguras

- ✓ Aísle al ave enferma.
- ✓ Corrija frío, humedad, polvo y corrientes.
- ✓ Ofrezca agua limpia y alimento.
- ✓ Revise a todo el lote dos veces al día.
- ✓ Contacte a un veterinario si no mejora rápidamente.

Alerta urgente

- ✗ Dificultad respiratoria marcada.
- ✗ Cara o párpados hinchados.
- ✗ Cuello torcido, temblores o parálisis.
- ✗ Color morado en cresta/patas.
- ✗ Mortalidad repentina o creciente.

No administrar “cualquier antibiótico por tres días”. Los antibióticos no curan virus y su elección incorrecta favorece resistencia, puede intoxicar y obliga a respetar tiempos de retiro para carne y huevos.



Video de apoyo

Pollito decaído tras el viaje

Notificación: ante mortalidad inusual o signos compatibles con Newcastle/ influenza, comuníquese con un veterinario y con la autoridad sanitaria correspondiente.

10. Estrés, picaje y bienestar

El picaje no suele aparecer “porque sí”. Es una señal de que el ambiente, la densidad, la dieta o la salud deben revisarse.

Causas frecuentes

- Falta de espacio o de comederos.
- Luz excesivamente intensa o permanente.
- Calor, sed o interrupción del alimento.
- Dieta desequilibrada o mezcla de edades.
- Heridas visibles, parásitos o aves débiles.
- Aburrimiento y ausencia de material para escarbar.


Qué hacer

- ✓ Separe al ave herida.
- ✓ Aumente espacio, bebederos y comederos.
- ✓ Reduzca la intensidad de luz.
- ✓ Revise temperatura y ventilación.
- ✓ Ofrezca alimento completo.
- ✓ Use enriquecimiento seguro: cama suelta, vegetales colgados, áreas de escarbar.

Observación diaria: un lote tranquilo se distribuye de manera uniforme. El ruido agudo, amontonamiento o persecución constante indican un problema.

TOCAR AQUÍ: VIDEO SOBRE ESTRÉS Y PICAJE

11. Crecimiento, huesos y reproducción



Protección de patas y articulaciones

- ✓ Piso con cama y buena tracción.
- ✓ Evitar perchas o gallineros altos.
- ✓ No permitir saltos repetidos desde superficies elevadas.
- ✓ Mantener peso corporal adecuado.
- ✓ Revisar dedos, almohadillas y articulaciones.

Calcio y minerales

La mejor prevención es un alimento completo con equilibrio calcio-fósforo-vitamina D. No agregue grandes cantidades de calcio durante el crecimiento. En ponedoras, el alimento de postura se introduce cerca del inicio de producción.

Pulseras o bandas: revise las patas al recibir. Retire bandas temporales de identificación para evitar que se incrusten conforme crece la pata.

Reproducción responsable

La madurez sexual puede comenzar cerca de los 6 meses, pero un gallo joven puede lastimar a hembras que aún no tienen tamaño o condición corporal suficiente. En estas líneas se recomienda esperar aproximadamente uno o dos meses adicionales y vigilar la relación macho-hembra, el peso y el estado de las gallinas.

Referencia visual de tamaño: las fotografías con cilindro de gas son un indicador comercial propio de Luz de León. El tamaño final depende de sexo, genética, nutrición, sanidad y manejo.

12. Garantías y reportes mensuales

Garantía de recepción

El cliente tiene derecho a recibir sus pollitos vivos. Si se registra una baja durante el transporte, Luz de León repone las aves; el cliente cubre el costo del nuevo envío.

Existe un periodo inicial de seguimiento de hasta cinco días, sujeto a evidencia y cumplimiento del manejo recomendado.

Garantía de tamaño

Criollo Mejorado: aplica al macho.

Gigante Puro: aplica a machos y hembras, según la política comercial comunicada al momento de la compra.

Si un ave no alcanza el estándar comercial al llegar a la madurez y se cumplieron los reportes, la compensación indicada es de cinco pollitos por cada ave que no cumplió.

SIN REPORTE MENSUAL NO HAY GARANTÍA DE TAMAÑO

El seguimiento evita confusiones, permite corregir el manejo a tiempo y demuestra que se trata del mismo animal recibido.

Evidencia obligatoria

- ✓ Video continuo al abrir la caja.
- ✓ Fotografías claras el día de recepción.
- ✓ Fotos y videos del alojamiento, cama, comederos y bebederos.
- ✓ Reporte mensual del crecimiento.
- ✓ Aplicación de las recomendaciones del manual.
- ✓ Comunicación inmediata ante enfermedad o mortalidad.

Exclusiones habituales: accidentes, depredadores, golpes, mezcla con aves enfermas, jaulas o pisos inadecuados, frío/calor extremo sin corrección, agua/alimento contaminado, medicación incorrecta y falta de reportes.



Garantías y transparencia

Toque o escanee el código

TOCAR AQUÍ PARA VER EL VIDEO DE GARANTÍAS

REPORTAR AHORA POR WHATSAPP

13. Entregas y envíos

Entregas en Santo Domingo

- ✓ Entrega personal en el Terminal Terrestre.
- ✓ Día habitual: jueves.
- ✓ Jornada aproximada de mañana: 07:00 a 09:00.
- ✓ Jornada aproximada de tarde: 14:00 a 16:00.
- ✓ Pago al momento de recibir.

Los horarios pueden variar según el número de entregas y salidas.

Envíos a otras ciudades

- ✓ Salidas habituales los jueves.
- ✓ Pago anticipado y confirmación previa.
- ✓ La transportadora y tarifa se confirman al cerrar el pedido.
- ✓ El cliente retira en el punto acordado.
- ✓ Se recomienda estar disponible desde la hora estimada de llegada.

Por seguridad y bioseguridad no se reciben visitas en la granja y no se publica su ubicación. Toda coordinación se realiza por canales oficiales.



Envíos realizados

Videos y evidencias

Compra segura

La empresa muestra su trabajo, mantiene redes activas y emite facturación electrónica. El cliente puede investigar antes de pagar; no se presiona la compra.

TOCAR AQUÍ PARA VER ENVÍOS REALIZADOS

14. Ciudades a las que hemos realizado envíos

119 destinos registrados. La lista se basa en el historial suministrado por la granja. Las rutas, empresas de transporte, disponibilidad y valores pueden cambiar; confirme siempre antes de pagar.

Azuay (2)

Cuenca
Ponce Enríquez

Carchi (2)

San Gabriel
Tulcán

Cotopaxi (5)

El Corazón
La Maná
Latacunca
Moraspungo
Salcedo

Bolívar (8)

Caluma
Chillanes
Echeandía
Guaranda
Las Naves
San Luis de Pambil
San Miguel de Bolívar
San Pablo de Atenas

Cañar (4)

Azogues
Cañar
La Troncal
Suscal

Chimborazo (2)

Cumandá
Riobamba

El Oro (10)

Arenillas

Atahualpa

El Guabo

Huaquillas

Machala

Pasaje

Piñas

Portovelo

Santa Rosa

Zaruma

Esmeraldas (9)

Atacames

Borbón

Chamanga

Esmeraldas

Las Golondrinas

La Unión - Quinindé

Muisne

Quinindé

San Lorenzo

Guayas (9)

Balzar

Durán

El Triunfo

El Empalme

Guayaquil

Milagro

Naranjal

Naranjito

Pedro Carbo

Imbabura (4)

Atuntaqui

Ibarra

Otavalo

Pimampiro

Loja (9)

Amaluza

Cariamanga

Catamayo

Loja

Macará

Saraguro

Vilcabamba

Yangana

Zapotillo

Los Ríos (7)

Babahoyo

Buena Fe

Quevedo

Quinsaloma

Valencia

Ventanas

Vinces

Manabí (14)

Calceta

Chone

El Carmen

Flavio Alfaro

Jama

Jipijapa

Manta

Paján

Paraíso La 14 - Manga del Cura

Pedernales

Pichincha

Portoviejo

Puerto López

Rocafuerte

Napo (1)

Tena

Orellana (2)

Coca

Sacha

Pastaza (1)

Puyo

Morona Santiago (3)

Gualaquiza

Macas

Sucúa

Pichincha (12)

Cayambe

Machachi

Nanegalito

Pedro Vicente Maldonado

Pifo

Puerto Quito

El Quinche

Quito

San Miguel de los Bancos

Sangolquí

Tabacundo

Tambillo

Santa Elena (1)

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas (2)

La Concordia

Santo Domingo

Sucumbíos (5)

Gonzalo Pizarro

Lago Agrio

Puerto El Carmen de Putumayo

Shushufindi

Tarapoa

Tungurahua (2)

Ambato

Baños

Zamora Chinchipe (5)

Palanda

El Pangui

Yantzaza

Zamora

Zumba

15. Videoteca educativa

Todos los títulos son enlaces activos. Toque el tema que desea revisar.

► **Cómo evitar diarreas: limpieza, agua y prevención**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Crecimiento y manejo del Criollo Mejorado**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Estrés y picaje en pollitos**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Peso y desarrollo de los mejorados**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Características del Gigante Colombiano**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Cómo recibir correctamente a los pollitos**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Adaptación de las aves a la Sierra**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Compra segura, transparencia y garantías**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Todo sobre el Criollo Mejorado**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Cómo evitar estafas al comprar aves**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Fortalecimiento óseo y manejo de aves grandes**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO

► **Pollito decaído o con signos respiratorios tras el viaje**

TOCAR AQUÍ PARA ABRIR EL VIDEO



Facebook



TikTok



Página web



WhatsApp

16. Formato de recepción y seguimiento

Registro del día de llegada

Cliente:		Ciudad:	
Fecha/hora:		Cantidad:	
Raza/línea:		Edad:	
Video de apertura:	☐ Sí ☐ No	Conteo correcto:	☐ Sí ☐ No
Agua ofrecida:		Alimento:	
Temperatura:		Estado de cama:	

Control mensual

Mes	Fecha	Cantidad viva	Peso de muestra	Fotos enviadas	Observaciones
1				☐ Sí ☐ No	
2				☐ Sí ☐ No	
3				☐ Sí ☐ No	
4				☐ Sí ☐ No	
5				☐ Sí ☐ No	
6				☐ Sí ☐ No	
7				☐ Sí ☐ No	
8				☐ Sí ☐ No	
9				☐ Sí ☐ No	
10				☐ Sí ☐ No	
11				☐ Sí ☐ No	
12				☐ Sí ☐ No	

Pese siempre aves similares, a la misma hora y con una balanza confiable. La variación individual es normal; observe tendencia del lote.

Lista rápida de revisión semanal

Aspecto	L	M	M	J	V	S	D
Agua limpia y disponible	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bebederos sin fugas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alimento fresco	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cama seca y suelta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sin olor fuerte a amoníaco	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aves distribuidas uniformemente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sin estornudos/secreción	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sin diarrea persistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Patas y dedos normales	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mortalidad registrada	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Una revisión de cinco minutos cada mañana y cada tarde puede detectar un problema antes de que afecte a todo el lote.

17. Fuentes técnicas consultadas

El contenido técnico fue contrastado con guías oficiales y literatura veterinaria. Los enlaces siguientes son clicables.

1. **AGROCALIDAD - Guía de Buenas Prácticas Avícolas**
<https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/pecu4.pdf>
2. **AGROCALIDAD - Recomendaciones de bioseguridad para producción avícola**
<https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/recomendaciones-de-bioseguridad-para-produccion-avicola-comercial-final-ok.pdf>
3. **AGROCALIDAD - Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de Newcastle (2025)**
<https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2025/08/Resolucion-0122.-Programa-Nacional-de-Prevencion-Manejo-y-Control-de-la-Enfermedad-de-Newcastle.pdf>
4. **Penn State Extension - Brooding of Domestic Fowl**
<https://extension.psu.edu/brooding-of-domestic-fowl>
5. **Mississippi State University Extension - Grow Healthy Chicks**
<https://extension.msstate.edu/4-h/4-h-livestock-program/youth-poultry/grow-healthy-chicks>
6. **Mississippi State University Extension - Poultry Water Line Sanitation**
<https://extension.msstate.edu/sites/default/files/publications/p2839.pdf>
7. **Merck Veterinary Manual - Management of Backyard Poultry**
<https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/backyard-poultry/management-of-backyard-poultry>
8. **Merck Veterinary Manual - Common Infectious Diseases in Backyard Poultry**
<https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/backyard-poultry/common-infectious-diseases-in-backyard-poultry>
9. **CDC - Chlorine: chemical safety and incompatible mixtures**
<https://www.cdc.gov/chemical-emergencies/chemical-fact-sheets/chlorine.html>
10. **Ficha técnica Promotor L 47.0**
<https://www.agrovet.cl/wp-content/uploads/2022/08/FT-promotor-L-mascotas.pdf>
11. **Ficha de producto Oxi Stress**
<https://lavetec.com.ec/producto/oxi-stress/>
12. **Ficha de producto Electravite**
<https://jamesbrownpharma.com/producto/electravite/>

Aviso sanitario: los medicamentos, vacunas y desinfectantes deben estar registrados para su uso, conservarse y aplicarse según la etiqueta. Toda mortalidad inusual debe ser reportada al profesional y autoridad competente.



Estamos para acompañarle

Criar aves grandes y sanas requiere constancia: agua limpia, alimento correcto, cama seca, temperatura estable, bioseguridad y seguimiento.

Incubadora y Granja Luz de León

Santo Domingo, Ecuador

WhatsApp: 096 052 9431

Lunes a viernes, 09:00 a 17:00

TOCAR AQUÍ PARA CONTACTARNOS



No se reciben visitas en la granja por razones de seguridad y bioseguridad.

Manual integral de recepción, crianza, salud, bioseguridad y garantías - Edición 1.0, julio de 2026.