




Manual práctico de cría de codornices

Desde 1 día de nacidas hasta postura, sanidad, alimentación y oportunidades de negocio

Postura y huevos limpios



Asesoría y pedidos

WhatsApp +593 96 052 9431

Toca el número o escanea el QR

Esríbenos por WhatsApp

1. Objetivo del manual

Guía de manejo para disminuir mortalidad, lograr buen crecimiento y preparar aves sanas para postura.

Este manual está pensado para personas que empiezan con codornices de 1 día de nacidas y desean llevarlas hasta la etapa de postura con buen manejo, buena alimentación y prevención sanitaria. Sirve para lotes pequeños familiares y para emprendimientos en crecimiento.

Regla de oro

En codornices, los primeros 7 días definen casi todo el resultado: calor estable, agua segura, alimento fino de alta proteína, cama seca y observación diaria.



Criadora con calor regulable

Use foco seguro o placa térmica, termómetro a la altura de las crías y una zona más fresca para que puedan alejarse del calor.




Bebedero anti-ahogo

Durante la primera semana use bebedero bajo con piedras/canicas limpias para evitar que las crías se mojen o se ahoguen.



Piso antideslizante y cama seca


Papel toalla los primeros días. Luego viruta seca, tamo o material absorbente. Evite periódico liso porque abre las patas.



Alimentado de alta proteína

Desde el primer día el alimento debe estar disponible, molido fino, fresco y seco.

Criadora segura





2. Manejo por edad: del día 1 a la postura

Cada semana se ajusta temperatura, espacio, alimento y control sanitario.

La temperatura debe medirse a la altura de las crías, no en la parte alta de la criadora. El comportamiento del lote confirma si el calor está correcto.

Edad	Temperatura guía	Manejo clave
Día 1 a 7	32 a 35 °C según clima local	Alimento molido desde la llegada. Agua con bebedero seguro. Piso con papel toalla. Revisar mañana y noche.
Día 8 a 14	29 a 32 °C	Reducir calor gradualmente. Cambiar a cama seca absorbente. Aumentar espacio. Vigilar diarreas y humedad.
Día 15 a 21	26 a 29 °C	Mayor actividad y consumo. Colocar tapa de malla porque empiezan a saltar. Evitar corrientes de aire.
Día 22 a 35	24 a 26 °C o menos si están emplumadas	Transición fuera de criadora solo si están emplumadas y la noche no es fría. No mezclar con aves adultas.
5 a 6 semanas	Ambiente estable y seco	Separar reproductores, seleccionar hembras de postura, controlar peso y uniformidad.
6 a 8 semanas	Etapas de inicio de postura	Cambiar gradualmente a balanceado de postura. Recolectar huevos 2 veces al día.

Lectura rápida del comportamiento

- Amontonadas debajo del calor y piando fuerte: tienen frío.
- Lejos del foco, jadeando o con alas abiertas: exceso de calor.
- Distribuidas, activas, comiendo y bebiendo: temperatura adecuada.
- Amontonadas en una esquina: posible corriente de aire o susto.

No retire el calor de golpe

Apague o suba el foco de forma gradual. Una cría mojada o fría se debilita rápido y deja de comer.

3. Alimentación: el balanceado correcto

La codorniz crece rápido; por eso necesita alimento fino, fresco y con proteína suficiente.



El mejor balanceado de postura es un alimento comercial específico para codorniz de postura o ave de caza/reproductora, en migaja fina o pellet pequeño. Revise la etiqueta: proteína cercana a 20-22%, calcio aproximado 2.5-3.5%, fósforo disponible y premezcla de vitaminas, minerales y aminoácidos.

Etapa	Alimento recomendado	Recomendación práctica
1 a 14 días	Iniciador de codorniz/ave de caza 26-28% proteína	Moler o tamizar fino. Colocar una parte sobre papel para que aprendan a comer. Disponible todo el día.
15 a 35 días	Crecimiento 24-26% proteína	Cambiar de forma gradual mezclando 3 días. Evitar alimento húmedo o viejo.
36 días a primer huevo	Prepostura/desarrollo 20-22% proteína	Preparar el sistema reproductivo sin exceso de calcio temprano.
Postura	Postura codorniz 20-22% proteína + calcio	La falta de calcio y proteína baja la postura y produce cáscara débil. Dar agua limpia siempre.
Reproductoras	Postura/reproductoras de buena calidad	Mantener machos y hembras en buena condición; no engordar. Huevos fértiles dependen también de manejo y genética.

No usar como dieta principal: maíz entero, arroz, pan, sobras de cocina o balanceado de baja proteína. Pueden darse como apoyo ocasional, pero no reemplazan el alimento completo.

4. Agua, higiene y bioseguridad

La prevención es más barata que tratar enfermedades.

Bioseguridad diaria



Agua	Cama y ambiente	Bioseguridad
Lavar bebederos a diario. En la primera semana use canicas o piedras limpias. El agua debe estar fresca, sin heces, sin alimento fermentado y sin olor.	Mantener seco. Cambiar cama húmeda. Ventilar sin corriente directa. El olor a amoníaco indica exceso de humedad y falta de ventilación.	Separar lotes por edad. Aislar aves nuevas. No prestar jaulas sin desinfectar. Controlar roedores, mosquitos, moscas, perros y gatos.
Una cría mojada pierde calor rápido. Revise que el bebedero no gotee ni humedezca la cama.	Use tapa de malla para evitar escapes y golpes. No use tapa sólida que acumule calor y humedad.	Retirar aves muertas de inmediato. Desinfectar entre lotes y dejar secar antes de recibir nuevas crías.

Manejo preventivo

No medique por costumbre. Use medicamentos solo con indicación profesional, respetando dosis, etiqueta y período de retiro para carne o huevos.



5. Vacunas y sanidad

No existe un calendario universal: depende de la zona, historial sanitario y presencia de otras aves.

La codorniz puede enfermar por fallas de calor, humedad, mala alimentación, coccidiosis, problemas respiratorios, viruela aviar, Newcastle u otras enfermedades. Para lotes comerciales, lo correcto es armar un plan con un médico veterinario o técnico avícola local, especialmente si hay gallinas, patos o pavos cerca.

Riesgo	Prevención principal	Cuándo pedir ayuda
Coccidiosis	Cama seca, poca humedad, densidad correcta. Algunos alimentos iniciadores incluyen coccidiostato; revisar etiqueta.	Diarrea café/rojiza, decaimiento, plumas erizadas, muerte repentina.
Newcastle	Bioseguridad estricta. Vacuna solo con esquema local autorizado y supervisado.	Síntomas nerviosos, respiratorios, muerte alta o caída brusca de postura.
Viruela aviar / quail pox	Control de mosquitos, mallas, limpieza. Vacunación si hay historial o brotes en la zona.	Costras en patas, párpados, pico o lesiones que sangran.
Ulcerativa / bacterianas	No mezclar edades, buena limpieza, evitar estrés y alimento en mal estado.	Diarrea fuerte, aves postradas, mortalidad rápida.
Parásitos externos	Control de cama, ceniza/baños de arena secos en sistemas de piso, limpieza de jaulas.	Picazón, pérdida de plumas, baja postura, aves inquietas.

Señales de alarma

- No comen, se quedan quietas o se enfrían.
- Diarrea persistente, sangre, olor fuerte o plumas pegadas.
- Respiran con el pico abierto, estornudan o tienen secreciones.
- Mueren varias en pocas horas o baja la postura sin explicación.

Importante

El uso de vacunas, antibióticos, antiparasitarios o coccidiostatos debe respetar etiqueta, disponibilidad legal y período de retiro. No venda carne ni huevos si no se ha cumplido el retiro.


6. Alojamiento y manejo de postura

Jaulas limpias, ventilación y luz adecuada sostienen la producción.

Las codornices de postura funcionan bien en jaulas o módulos siempre que tengan piso seguro, buena ventilación, protección de depredadores y acceso constante a alimento y agua. En producción de huevos, la uniformidad del lote ayuda a mantener una postura estable.

Área	Recomendación
Densidad	Evite sobrepoblar. En jaulas pequeñas, calcule espacio suficiente para que coman y beban sin empujarse. Si hay picaje, baje densidad y luz.
Luz	Para postura constante, trabajar con 14-16 horas de luz total al día, sin cambios bruscos. Mantener luz suave para evitar estrés.
Machos para fértiles	Manejo orientativo: 1 macho por 3 a 5 hembras, según línea y comportamiento. Retire machos agresivos.
Huevos	Recolectar 2 veces al día. Conservar limpios, en lugar fresco, con punta hacia abajo si se usarán para incubar.
Golpes	Las codornices saltan verticalmente. Use techo bajo o material que amortigüe para evitar golpes en la cabeza.
Registros	Anote mortalidad, consumo de alimento, huevos diarios y cambios de alimento. Sin registros no se sabe si el negocio gana o pierde.

Postura y huevos limpios





7. Checklist de manejo

Use esta página para revisar el lote todos los días.

Frecuencia	Qué revisar	Acción rápida
2 veces al día	Temperatura, distribución de crías, agua, alimento, mortalidad.	Ajustar calor, limpiar bebedero, retirar aves muertas y anotar novedades.
Diario	Cama húmeda, olor, alimento derramado, escapes, depredadores.	Cambiar cama mojada, asegurar tapa, mejorar ventilación sin corriente directa.
Cada 3 días	Crecimiento uniforme, patas abiertas, picaje, plumas dañadas.	Separar débiles, mejorar piso, bajar luz o densidad si hay picaje.
Semanal	Peso promedio, consumo de alimento, limpieza profunda de bandejas.	Comparar con registros y corregir alimento, espacio o higiene.

Errores comunes que matan crías

1. Falta de calor o calor sin zona de escape.	2. Bebederos profundos: crías mojadas o ahogadas.
3. Balanceado de pollo bajo en proteína o granos enteros.	4. Piso resbaloso que causa patas abiertas.
5. Humedad, cama sucia y exceso de amoníaco.	6. Mezclar aves nuevas o adultas con crías sin cuarentena.

Dato de negocio

Un lote bien manejado no solo produce más: también da confianza al comprador cuando usted muestra registros, fotos, fechas de nacimiento y recomendaciones claras.



8. Ideas para hacer negocio con codornices

No dependa de un solo producto: combine huevos, aves, asesoría y valor agregado.

1. Huevos frescos	Venta semanal a hogares, tiendas, restaurantes, gimnasios y clientes de alimentación saludable.
2. Huevos fértiles	Para clientes con incubadora. Entregar con fecha, manejo de conservación y recomendación de incubación.
3. Crías de 1 a 7 días	Venta de polluelos con guía de manejo. Ideal incluir kit inicial: alimento molido + bebedero seguro.
4. Codornices próximas a postura	Mayor precio porque el cliente reduce riesgo y tiempo de crianza.
5. Carne de codorniz	Canal para restaurantes, parrilladas o clientes gourmet, cumpliendo normativa local.
6. Huevos cocidos/encurtidos	Producto de valor agregado para tiendas, eventos y emprendimientos de comida.
7. Servicios de incubación	Cobro por huevo incubado o por porcentaje acordado, dejando reglas claras de riesgo.
8. Abono orgánico	La gallinaza/codornaza compostada puede venderse a huertos y jardinería.
9. Paquetes de inicio	Combo: 10, 20 o 50 codornices + recomendaciones + contacto de soporte.
10. Contenido y asesoría	Videos cortos, fichas técnicas y acompañamiento pagado para nuevos criadores.

Mini fórmula para saber si conviene

Ingresos = huevos vendidos + aves vendidas + productos de valor agregado. **Costos** = alimento + cama + luz/calor + mortalidad + transporte + empaques + mano de obra. Si no anota estos datos, no sabrá su ganancia real.



9. Hoja rápida de control del lote

Puede imprimir esta tabla y llenarla cada semana.

Dato	Registro
Fecha de nacimiento / llegada	
Cantidad recibida	
Alimento usado y proteína	
Temperatura semana 1 / 2 / 3 / 4	
Mortalidad semanal	
Consumo de alimento por semana	
Primera fecha de postura	
Huevos diarios promedio	
Observaciones sanitarias	



Incubadora Luz de León

Asesoría, ventas y acompañamiento básico para nuevos criadores.

WhatsApp: +593 96 052 9431

<https://wa.me/593960529431>

Fuentes técnicas consultadas

Mississippi State University Extension Service: programas de alimentación de codornices, temperaturas de crianza, medicaciones en alimento y viruela de codorniz. Poultry Extension: crianza de codornices y bioseguridad. The Poultry Site: guía de crianza de codorniz japonesa. Esta guía es educativa y debe adaptarse a la realidad sanitaria de Ecuador y a la recomendación de un profesional avícola.